


PRESSO LO "SPAZIO GIRASOLE" È
POSSIBILE EFFETTUARE VALUTAZIONI DEL
FRENULO LINGUALE IN BAMBINI ED ADULTI

**VALUTAZIONE
DEL FRENULO
LINGUALE**

Frenulo
linguale



Dal punto di vista anatomico, il frenulo linguale è la sottile lamina di tessuto di natura fibro-mucosa che unisce la superficie inferiore della lingua al pavimento orale.

**COS'E' IL
FRENULO
LINGUALE?**

In base alle sue inserzioni, alla sua lunghezza e al range di movimenti della lingua, un frenulo linguale può risultare

ALTERATO

**COS'E' IL
FRENULO
LINGUALE?**



Ciò costituisce un'anomalia anatomica congenita che può condurre a conseguenze che impattano le diverse funzioni orali:

**QUALI
CONSEGUENZE?**

SUZIONE



**MASTICAZIONE
E
DEGLUTIZIONE**



**ARTICOLAZIONE
VERBALE DEL
LINGUAGGIO**


Si aggiungono inoltre:



**PROBLEMI DI
OCCLUSIONE
DENTALE**

**QUALI
CONSEGUENZE?**

**DIFFICOLTA'
NELL'IGIENE ORALE**



**POSSIBILI
ALTERAZIONI
POSTURALI**

Intorno a questo disturbo ruotano varie figure professionali.

**CHI SE NE
OCCUPA?**

PEDIATRA

LOGOPEDISTA

DENTISTA

OTORINOLARINGOIATRA

FONIATRA

In caso di sospetta alterazione del frenulo può essere utile rivolgersi a una di queste figure, che decideranno se sia necessaria una valutazione

Nel nostro centro la valutazione viene effettuata avvalendosi di vari protocolli (sia per l'epoca neonatale, infantile fino all'età adulta) costituiti da osservazioni cliniche generali, strutturali e prove funzionali.

**IN BASE AL RISULTATO, LE
LOGOPEDISTE VALUTANO SE E'
NECESSARIO INVIARE IL PAZIENTE
ALL'INTERVENTO CHIRURGICO.**

COME?

È consigliabile effettuare alcune sedute di logopedia nel **periodo pre-intervento**, per:

- far prendere coscienza al paziente delle limitazioni presenti

- prendere confidenza con alcuni movimenti che dovrà eseguire nel post-operatorio al fine di ottenere, in seguito all'intervento, il miglior risultato possibile in termini di mobilità della lingua.

Nel **periodo post-intervento** l'obiettivo è quello di

- tenere la lingua "in movimento", al fine di ridurre la probabilità di formazione di cicatrici,

- rinforzare ed educare la lingua alla nuova situazione anatomo-funzionale, ripristinando le funzioni orali alterate.